



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας
Τηλ.: 26510 40707, 2651041902

Να
κρατηθεί σε
αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (**εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα**) για την
καλλιέργεια της **ελιάς**

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ	+											+	7
ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ		+	+	+		+	+	+	+		+		3
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΣΙΛΙΚΕΙΤ												+	0
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ (Βιολογικό)	+												0
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+			+					+	Δολωματικοί + καλύψεως 7
ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+		+		+				+	+		+	-Δολωμ.ψεκασμοί για δάκο 7 ημέρες -Ψεκ. Καλύψεως: 7 ή 14 ή 120 ημέρ. (ανάλογα με το σκεύασμα)
ΜΑΛΤΟΝΤΕΞΤΡΙΝ		+	+					+			+		ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ (Βιολογικό)												+	0
ΟΡΑΝΤΖ ΟΙΛ		+	+					+					1
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ		+	+			+	+	+			+		21
ΠΥΡΕΘΡΙΝΣ	+												5
ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ			+										Πριν άνθηση
ΣΟΥΛΦΟΥΡ											+		90 (πράσινη ελιά Χαλκιδικής)
ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ												+	Δολωμ.ψεκ.14
ΣΥΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ	+											+	-Δολωμ.ψεκ. / 7 (δάκος) -2 ψεκασμοί

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
													ανά 3 έτη /14 (πυρηνοτρήτης)
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ												+	-
ΦΛΟΥΠΥΡΑΝΤΙΦΟΥΡΟΝ			+									+	1 εφαρμογή ανά έτος /14

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (εντομοελκυστικές) για την καλλιέργεια της
ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
(Z) – 7 - ΤΕΤΡΑΝΤΕΣΕΝΑΛ	+												1 εφαρμογή ανά έτος πριν την πρώτη πτήση του εντόμου
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ												+	Δολωμ.ψεκ. εδάφους
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΟΥΡΙΑ												+	Δολωμ.ψεκ. εδάφους

Σημείωση : 1. Οι δραστικές ουσίες **Δελταμεθρίν, Λάμδα συαλοθρίν** και **Υδρολυμένες πρωτεΐνες** κυκλοφορούν και σε σκευάσματα που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση του **δάκου** με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα ελαιόδεντρα. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης του δάκου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις ελιές.

2. Η δραστική ουσία **(z) -7- τετραντεσενάλ** είναι φερομόνη προσέλκυσης των αρσενικών ακμαίων ατόμων του **πυρηνοτρήτη** και εφαρμόζεται με κρέμασμα των διαχυτήρων στα κλαδιά των ελαιόδεντρων. Είναι μέθοδος μαζικής παγίδευσης του πυρηνοτρήτη πιο φιλική προς το περιβάλλον, που για να έχει όμως καλό αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχουν χαμηλοί μόνον πληθυσμοί του εντόμου.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).
Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.
Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.
Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας
Τηλ.: 26510 40707,2651041902

Να
κρατηθεί σε
αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες **(μυκητοκτόνα)** για την καλλιέργεια της
ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΑΜΥΛΟΛΙΚΟΥΕΦΑΣΙΕΝΣ			+	Έως την πλήρη ωρίμανση
ΓΕΡΑΝΙΟΛ-ΕΥΓΕΝΟΛ-ΘΥΜΟΛ			+	7 (Πριν την ανθοφορία και στην έναρξη της ωρίμανσης)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ	+			-Πριν άνθηση (βρώσιμες ελιές) -30 (ελαιοποιήσιμες ελιές)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ + ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+		+	Πριν την άνθηση
ΜΕΦΕΝΤΡΙΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	+		+	21
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+		+	30
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ + ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΝΤΟΝΤΙΝ	+		+	7
ΟΡΑΝΤΖ ΟΙΛ			+	1
ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΦΟΣΦΟΝΕΙΤ	+			15
ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	105
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	+			1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	14 (max: 2 εφαρμογές / 1 μόνον εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου)
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+	+	+	14 / 15 / 21
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ	+	+	+	21

ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ	+			21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ + ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+		+	Πριν την ανθοφορία ή μετά τη συγκομιδή

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες **(ενεργοποιητές των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών)** για την καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΚΟΣ-ΟΤΖΑ (COS-OGA)			+	0
ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ			+	-
ΣΕΡΕΒΙΣΕΙΝ (CEREVISANE)			+	1

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάξτε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, 5 Φεβρουαρίου 2026